

Fuenlabrada, 05 de octubre de 2018

Estimadas familias:

Les comunicamos que se ha detectado la presencia de piojos en algunos de los niños del Centro. La aparición de brotes de pediculosis en escolares se ha hecho habitual en los colegios de Madrid.

Desde hace unos años, se observa un aumento de la PEDICULOSIS (PIOJOS) en el hombre. Los niños/as son los que con más frecuencia se infestan por estos insectos, sobre todo en los colegios, por ser un lugar donde coincide mucha gente.

Los piojos se encuentran ampliamente distribuidos en todas las clases sociales y, por tanto, no han de constituir motivo de complejo, sino simplemente admitir que es un problema sanitario.

El piojo llega a la cabeza y se agarra a un pelo, se alimenta chupando la sangre del cuero cabelludo, las hembras ponen huevos (las llamadas LIENDRES), que sujetan a un pelo con pegamento difícil de disolver; la liendre es una formación blanca, ovalada, que se distingue de la caspa porque está muy sujeta al pelo. De estos huevos, al cabo de 7 a 15 días vuelve a salir un nuevo piojo que pronto se hará adulto y comenzará a picar y poner más huevos.

RECOMENDACIONES PARA EVITAR LA PEDICULOSIS

Los piojos de la cabeza pasan fácilmente de una persona a otra por lo que es muy importante mantener medidas higiénicas adecuadas:

1. Lavar con frecuencia el pelo.
2. Peinar y cepillar diariamente el cabello.
3. Revisar frecuentemente la cabeza de los niños/as (sobre todo detrás de las orejas y en la nuca).
4. Limpiar peines y cepillos con frecuencia.
5. No intercambiar útiles como peines, gomas, gorros, etc.
6. El uso de algunos productos como el ACEITE DE ÁRBOL DE TÉ, ayudan en la prevención

TRATAMIENTO EN CASO DE PEDICULOSIS

Si descubrimos la presencia de liendres o piojos, será necesario seguir los siguientes pasos:

1. Solicite a su farmacéutico una loción antiparasitaria, preferiblemente a base de piretrinas.
2. Mojar todo el cabello y cuero cabelludo con la LOCIÓN PEDICULICIDA. No lavar el cabello antes de aplicar la loción.
3. Pasadas 2 a 4 horas lavar el cabello con champú normal o pediculicida.
4. No secar el pelo con secador.
5. Una vez aclarado el pelo, quitar las liendres con la mano (es lo más eficaz) o con una liendreras (peine de púas muy juntas).
6. El tratamiento debe repetirse a los 10 y 20 días.
7. Los peines, adornos del pelo, etc., se deben sumergir una hora en loción pediculicida. La ropa, toallas, etc. se deben lavar con agua caliente.
8. Se debe revisar a todos los que conviven con el niño/a parasitado para poner tratamiento siempre que se detecten liendres o piojos.

Atentamente

La Dirección